

BROMACHEM mamci

DUO-RAT mamci

Rodenticid za opštu i za profesionalnu upotrebu, namenjen za kontrolu populacije glodara, za suzbijanje sivog pacova (*Rattus norvegicus*), crnog pacova (*Rattus rattus*), domaćeg kućnog miša (*Mus musculus*) i poljskog miša (*Apodemus agrarius*) u domaćinstvu, javnim objektima i na farmama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Mamac postavljati na gomilicu na kartonsku tacnu ili u kutije - klopke za postavljanje mamaca. Postavljati na mestima u blizini legla, na mestima gde se glodari hrane i na mestima gde se njihovo prisustvo najviše primećuje.

NAČIN UPOTREBE

Preparat se može koristiti samo na površinama nedostupnim deci, domaćim i divljim životinjama.

Pri postavljanju biocidnog proizvoda treba voditi računa o broju glodara i mestu postavljanja. Treba imati u vidu da se najbolji rezultati u suzbijanju glodara postižu ako se mamci postavljaju na mestima u blizini legla, na mestima gde se hrane i na mestima gde se njihova aktivnost najviše primećuje. Uginule glodare pokupiti i spaliti da ih ne bi pojele domaće životinje, zbog opasnosti od trovanja.

Preporučene količine za zrno i za pelete su:

- Za pacova: 50 – 100 g na gomilicu na svakih 10 metara
- Za miša: 20 – 30 g na gomilicu na svakih 5 metara

Postavljene mamce dovoljno je kontrolisati 2 do 3 puta u razmaku od 5 do 7 dana. Ukoliko je utrošak veliki preporučuje se dopunjavanje mamaca.

Za uništavanje glodara na otvorenim površinama treba 24h pre upotrebe biocidnog proizvoda sve rupe izravnati ili zagaziti da bi se idućeg dana uočile one koje su aktivne. Mamci se stavljaju u rupe u količini od 20 g u svaku aktivnu rupu, nakon čega se rupa zatvori, odnosno zatrpava zemljom. Suzbijanje glodara na otvorenim površinama sprovodi se u jesen ili proleće.

Preporučene količine za parafinski blok su:

- Za pacova: 4 – 6 kockica bloka (50 – 75 g) na gomilicu na svakih 5 - 10 metara
- Za miša: 2 – 4 kockice (25 – 50 g) na gomilicu na svakih 2 - 5 metara

Postavljene mamce dovoljno je kontrolisati 2 do 3 puta u razmaku od 5 do 7 dana. Ukoliko je utrošak veliki preporučuje se dopunjavanje mamaca.

ČUVANJE

Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i provetrenom mestu van domašaja dece !

BROJ I INTERVAL PRIMENE

Redovna deratizacija, 2 puta godišnje, na proleće i u jesen.

U slučaju primećene aktivnosti glodara mamce pimeniti češće, sve do prestanka aktivnosti glodara.

Period zabrane pristupa: Onemogućiti pristup izloženih mamaca deci, kućnim ljubimcima, domaćim i divljim životinjama (ukoliko se mamci postavljaju van urbanih sredina).

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Za vreme postavljanja mamaca zabranjeno je jesti, piti i pušiti.

Mamce postavljati dalje, min. 5 metara od izvorišta, bunara i vodotokova.

Ne kontaminirati hranu, pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže.

Za vreme postavljanja mamaca nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, rukavice i odeću. Po potrebi nositi zaštitnu masku.

Nakon upotrebe a pogotovu pre jela oprati ruke i eksponiranu kožu.

Držati samo u originalnom pakovanju na bezbednom mestu van domašaja dece.

Sa neutrošenim količinama postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09) a sa praznom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

PRVA POMOĆ I ANTIDOT

Čovek: obilna lavaža želuca, vitamin K1, transfuzija sveže krvi uz vitamin K1.

Životinje: ispiranje želuca i primena vitamina K1, infuzija glukoze i fiziološkog rastvora i transfuzija sveže krvi.

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA, TELEFON (24 sata) 011 3608 440 i 011 3608 234.