

# EXIT 100 SC

## formulacija piretroida cipermetrina

Insekticid za upotrebu protiv letećih i gmižućih insekata, muva (*Musca domestica L.*), mrava (*Lasius niger*), bubašvaba (*Blattella germanica* i *Blatta orientalis*) i buva (*Ctenocephalides felis*) primenom prskanjem po zidovima, po poroznim i neporoznim površinama: kuhinja, bolnica (gde pacijenti ne borave), fabrika, skladišta, hotela, restorana, u okolini zgrada, garaža, farmi...

SC, koncentrat za suspenziju je stabilna formulacija pri čemu je voda nosač. Prilikom aplikacije stvaraju se čestice mikronske veličine, aerosol, koj prodire do svih mesta gde se leteći i gmizujući insekti nalaze.

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN PRIMENE	PRSKALICA		
STEPEN INFESTACIJE	EXIT 100 SC	voda	pokriva površinu
Teška infestacija	50 ml.	5 lit.	100 – 150 m <sup>2</sup>
Redovan tretman	25 lit.	5 lit.	100 – 150 m <sup>2</sup>

### ČUVANJE

Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i provetrenom mestu. Prazna ambalaža se ne koristi za druge namene.

### BROJ I INTERVAL PRIMENE

Redovna dezinskecija na svakih 6 meseci.

**Period zabrane pristupa prostoru:** u slučaju aplikacije zatvorenog prostora 4-6 sati nakon aplikacije.

### MERE PREDOSTROŽNOSTI

Ne prskati pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže.

Zaštiti i pokriti sve posude za hranu i za vodu prilikom primene.

Ne primenjivati direktno na životinje, po stoci ili živini.

Zaštiti akvarijume i posude u kojima se nalaze ribe.

Ne zagađivati vodotokove prilikom primene.

Za vreme aplikacije nositi odgovarajuću zaštitnu opremu, masku i rukavice i odeću.

Ne udisati maglu koja se stvara prilikom prskanja. Po potrebi nositi zaštitnu masku, zaštitne naočare ili vizir.

Nakon upotrebe a pogotovu pre jela oprati ruke i eksponiranu kožu.

Držati samo u originalnom pakovanju na bezbednom mestu van domašaja dece.

Sa neutrošenim količinama postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09) a sa praznom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

### PRVA POMOĆ

Ukoliko preparat dospe u oči, odmah vršiti ispiranje sa dosta vode, u trajanju 10-15 minuta, i nakon toga potražiti savet lekara.

Ukoliko se preparat unese oralnim putem ne izazivati povraćanje, već odmah tražiti savet lekara.

Nema specifičnog antidota, već se preporučuje simptomatska terapija. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Beograd

**U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA,  
TELEFON (24 sata) 011 3608 440**