

KOMTOKS

formulacija piretroida permetrina, bioaletrina i sinergista piperonil butoksida

Insekticid namenjen za suzbijanje adulta komaraca (*Aedes aegypti*, *Aedes sticticus*, *Culex pipiens*, *Aedes vexans*...) na otvorenim površinama, u urbanim sredinama, izletištima, ruralnim područjima, u priobaljima i u blizini jezera, bara.

Primenjuje se ULV uređajima za hladno zamagljivanje i termofogerima za toplo zamagljivanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NAČIN PRIMENE	KOMTOKS	kerozin	voda	
PRIMENA NA OTVORENOM PROSTORU				količina smeše po hektaru
TOPILIM ZAMAGLJIVANJEM ⁽¹⁾	0,1 lit.	0,9 lit.		1 lit.
HLADNIM ZAMAGLJIVANJEM	0,1 lit.		0,9 lit.	0,5 litara
PRIMENA U ZATVORENOM PROSTORU				površina koja se tretira
RUČNA PRSKALICA	0,5 lit.		4,5 lit.	500 m ²

(1) Ukoliko je razblaženje kerozinom veće, voditi računa da se primenjuje 100 mL preparata po hektaru.

Najbolja efikasnost se postiže tretmanima u vreme optimalne aktivnosti komaraca, što je uglavnom kasno popodne i u rano veče. Aplikaciju vršiti ULV generatorima koji mogu da proizvedu kapi veličine 50-75 mikrona. Vozilo na kojem je smešten ULV generator prilikom aplikacije trebalo bi da se kreće brzinom ne većom od 10-15 km/čas.

Pre svakog tretmana obavezna je provera kalibrisanosti i ispravnosti uređaja za aplikaciju.

ČUVANJE

Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i provetrenom mestu. Prazna ambalaža se ne koristi za druge namene, već se vraća snabdevaču.

BROJ I INTERVAL PRIMENE

U zavisnosti od brojnosti komaraca i vremenskih uslova – u proseku na 2 do 3 nedelje u periodu od početka maja do kraja septembra.

Period zabrane pristupa: nema zabrane prilikom aplikacije na otvorenom.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

Ne sme se pušiti, piti i jesti. Ne dozvoliti kontakt preparata sa površinom tela. Obavezno koristiti sredstva lične zaštite: nepromočivo radno odelo, gumene čizme i rukavice, naočari ili štitnik za lice. Imati u vidu da koncentrovani preparat može izazvati iritaciju očiju. Po završenom rukovanju preparatom treba dobro oprati lice i ruke sapunom.

Prilikom tretiranja ne dozvoliti kontaminaciju izvorišta vode, vodotokova i jezera.

Sa neutrošenim količinama postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09) a sa praznom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

PRVA POMOĆ

Ako preparat dospe u oči, odmah vršiti ispiranje sa dosta vode, u trajanju 10-15 minuta, i nakon toga potražiti savet lekara.

Ako se preparat unese oralnim putem ne izazivati povraćanje, već odmah tražiti savet lekara.

Nema specifičnog antidota, već se preporučuje simptomatska terapija. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Beograd

U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA, TELEFON (24 sata) 011 3608 440 i 3608 234