

# **TWENTY – 1**

## **10% AZAMETIFOS**

Insekticid namenjen za suzbijanje kućne i stajske muve (*Musca domestica*, *Fania canicularis* i *Stomoxys calcitrans*) primenom premazivanjem ili prskanjem po zidovima, plafonu, prvenstveno štala, svinjaca, kokošnjaca i drugih mesta gde se čuvaju životinje.

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

NAČIN PRIMENE	TWENTY-ONE	mlaka voda	pokriva prostoriju površine
PREMAZIVANJE <sup>(1)</sup>	100 g	100 ml	40 – 80 m <sup>2</sup>
	25 g	25 ml	10 – 20 m <sup>2</sup>
PRSKANJE <sup>(2)</sup>	100 g	4 lit.	40 – 80 m <sup>2</sup>

- (1) Pomešati preparat i mlaku vodu do postizanja viskozne tečnosti.  
Nanošenje obaviti četkom ili valjkom za farbanje po zonama, na mestima gde se muve sakupljaju.  
Primeniti po osunčanim površinama, okvirima vrata i okvirima prozora prostorije.  
Ukoliko je infestacija muva velika, ili ukoliko nema dovoljno površina za nanošenje naneti preparat na delove kartona ili šper ploče površine 20 x 30 cm i okačiti ih o plafon
- (2) Po potrebi, ukoliko je jaka infestacija, dodati 100 g šećera.  
Nakon ubacivanja preparata u prskalicu dobro promućkati.  
Prskati prvenstveno po osunčanim površinama, okvirima vrata i okvirima prozora prostorije kao i po plafonu

### **ČUVANJE**

Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom i provetrenom mestu. Prazna ambalaža se ne koristi za druge namene, već se vraća snabdevaču.

### **BROJ I INTERVAL PRIMENE**

Na svakih 60 do 90 dana u zavisnosti od infestacije, ponekada pogotovo u letnjim mesecima i češće  
**Period zabrane pristupa prostoru:** u slučaju aplikacije prskanjem 4-6 sati nakon aplikacije

### **MERE PREDOSTROŽNOSTI**

Ne primenjivati na poroznim površinama.  
Udaljiti se od tretiranih površina dok se preparat ne osuši.

Za vreme primene udaljiti prisutno osoblje i ukloniti sve životinje i svu živinu – ni u kom slučaju ne primenjivati, prskati direktno životinje ili na živinu.

Zaštiti opremu za mužu, posude za mleko i pokriti sve posude za hranu i za vodu prilikom primene.  
Ukoliko se primena vrši prskanjem pre primene pokupiti sva jaja i hranu za živinu.  
Ne kontaminirati hranu, pribor za hranu ili površine na koje se hrana odlaže.

Za vreme upotrebe nositi odgovarajuću zaštitinu opremu, masku i rukavice i odeću.  
Ne udisati prašinu ili maglu koja se stvara prilikom prskanja. Po potrebu nositi zaštitnu masku, zaštitine naočare ili vizir.

Nakon upotrebe a pogotovo pre jela oprati ruke i eksponiranu kožu.  
Držati samo u originalnom pakovanju na bezbednom mestu van domaćaja dece.  
Sa neutrošenim količinama postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09) a sa praznom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

### **PRVA POMOĆ**

Ako preparat dospe u oči, odmah vršiti ispiranje sa dosta vode, u trajanju 10-15 minuta, i nakon toga potražiti savet lekara.  
Ako se preparat unese oralnim putem ne izazivati povraćanje, već odmah tražiti savet lekara.  
Nema specifičnog antidota, već se preporučuje simptomatska terapija. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Beograd.

**U SLUČAJU NEZGODE POTRAŽITI SAVET OD NACIONALNOG CENTRA ZA KONTROLU TROVANJA VMA,  
TELEFON (24 sata) 011 3608 440**