

VITRA WP

bakar u obliku bakar(II)hidroksida, 500g/kg

UPUTSTVO ZA PRIMENU

PRIMENA: nesistemični fungicid, baktericid sa preventivnim delovanjem, koji se koristi u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovaca plamenjače (*Plasmopara viticola*).

Primeniti prskanjem u dozama od 35g -40 g preparata u 10 l vode (koncentraciji 0,3%-0,4%). Tretiranje se vrši preventivno, pre ostvarenja uslova za sekundarne zaraze.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: U toku godine na istoj površini može se primeniti dva puta.

FITOTOKSIČNOST: Ukoliko se preparat primenjuje prema uputstvu (vreme primene i koncentracija) nema opasnosti od fitotoksičnosti. Može biti fitotoksičan za biljke na kojima se primenjuje ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.

PRIPREMA SREDSTVA ZA PRIMENU I NAČIN PRIMENE : Odmerenu količinu preparata treba prethodno izmešati sa malo vode, a zatim uz stalno mešanje preneti u rezervoar u kome se nalazi preostala količina vode.

Primena se može obaviti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje.

Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena.

MEŠANJE SREDSTVA: Može se mešati sa preparatima na bazi sumpora u zasadima vinove loze, uz uslov da pH mešavine ostane neutralan, mineralnim uljima za primenu tokom mirovanja vegetacije. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije kao što su heptenofos, dihlorvos, dimetoat i tiramom, fosetil aluminijumom i kalcijum polisulfidom.

KARENCA: Vreme poslednjeg tretiranja pred berbu 21 dan za vinovu lozu.

TOLERANCA MDK (maksimalno dozvoljena količina ostataka u mg/kg): 100mg/kg za hmelj, 50 mg/kg za celer i čaj, 40mg/kg za grožđe, 10 mg/kg za voće i 5 mg/kg za krompir, paradajz, luk, kupus, krastavac i ostalo.

SIMPTOMI TROVANJA, PRVA POMOĆ I LEČENJE:

U slučaju nesreće ili u slučaju mučnine odmah potražiti savet lekara / ako je moguće pokazati etiketu i uputstvo za upotrebu.

Simptomi i znaci trovanja: Povraćanje, diareja, i bol u ustima, duž jednjaka i želuca (jer deluje iritativno na sluznicu), prolivi sa ili bez grčeva u trbuhu i pojavom krvi u stolici. Ubrzan puls može biti predznak cirkulatornog šoka. Može se javiti i oštećenje jetre sa žuticom kao i methemoglobinemija. Anurija je znak oštećenja bubrega.

Prva pomoć i lečenje: Bez obzira na spontano povraćanje otrovanom treba isprati želudac i dati belance od jajeta. U zdravstvenoj ustanovi prevenirati nastanak šoka i tubularnog začepjenja usled hemolize, korigovati elektrolitski i hidracioni disbalans. Ukoliko simptomi perzistiraju treba dati antidote (BAL i penicilamin). U slučaju intenzivne methemoglobinemije dati metilensko plavo (1-2 mg/kg telesne težine 1% rastvora). U slučaju akutne bubrežne insuficijencije primeniti hemodijalozu, a u slučaju toksičnog oštećenja jetre daju se hepatoprotektivi i vitamini.

U slučaju trovanja ili pojave simptoma nakon upotrebe ovog sredstva, obavezno se javiti nadležnom lekaru sa ovim uputstvom. Lekar ili pacijent se mogu javiti i Centru za kontrolu trovanja VMA, Crnotravska 17, 11 000 Beograd, tel. 011/2662-381 ili 3608-440, radi dobijanja detaljnijih informacija, stručne konsultacije i preporuke za dalji tretman zatrovanog.

UNIŠTAVANJE PROIZVODA I AMBALAŽE:

Sa praznom ambalažom i suvišnom količinom preparata postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09) i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu (sl.gl RS 36/09).

PROSIPANJE I CURENJE:

Prosipanje lokalizovati zemljom ili nekim drugim absorptivnim materijalom. Tretirati kao opasan otpad. Sve sakupiti i ostaviti u namenske sudove i postupiti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (sl.gl RS 36/09).

Oprati zaprljanu površinu sa dosta vode. Prosuti materijal se ne sme upotrebiti.

ZAŠTITNE MERE U SLUČAJU NESREĆE KOD PREVOZA:

Preparat transportovati pažljivo. Ne stavljati pakovanja preparata ispod teških predmeta, u vozila koja prevoze putnike, stoku, namirnice. Ukoliko dođe do saobraćajne nesreće, odmah postaviti odgovarajuće znake, obavestiti policiju, stručne službe, a prema potrebi i vatrogasce.

GAŠENJE POŽARA:

Ukoliko su preparat i ambalaža izloženi vatri, ambalažu hladiti polivanjem vodom. Požar gasiti fino raspršenom vodom, penom ili suvom hemikalijom. Ne upotrebljavati vodene mlazeve. U slučaju požara ne udisati dim.

SKLADIŠTENJE:

Preparat čuvati na suvom i hladnom mestu sa dobrom ventilacijom, na temperaturi ne nižoj od -10°C , a ne višoj od 35°C , u dobro zatvorenoj, originalnoj ambalaži, pod ključem, van domašaja dece, odvojeno od namirnica, pića, stočne hrane i predmeta opšte upotrebe.

NAPOMENA:

Proizvođač garantuje za kvalitet proizvoda, a rizik nepravilnog skladištenja i primene ne snosi. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.